Précoce d'Astrakan

Vass8R03s146-150

Directore of American 0Mtp928

Collection Vassal-Montpellier

Précore d'Astralean Cl8 R3 s 146-150







duatuuluutuuluutuulustuol



dantadantadantadantad

RANG 3 Souche 146-150

Disignation: Precent distrakan

Année:

Vérason:

1-8

12-9.88

11:3

Pour.: 0

+4

ENAPE: G-M-P-Dim.: 10

£)-M-C

Rignaur:

4

POPI: érig - (1/2) érig - couché

Année:

TG-G-M-P-Dim.: 19

Année:

TG-G-M-P-Dim.: 10

ANNEE 1987 NOM Preisse d'Ashakan EMPLACEMENT 8 R3 s 146-150

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f		Vé: début	raisor mi/v		Maturité	
1 2 3 4 . 5	3 5 5 5 4	23.3 23.3 23.3 23.3 23.3	27,3 27,3 27,3 27,3	03223				16,6	3,8	6.8	10-8	3.3 +3	
	22		28,3	10	4,5	\$	8,6		1	I	ort er	ige"	
	+1					+1				Port evige Viguen 3,5			

dantaalaataalaataal

NOM Precoce d'Astraham EMPLACEMENT & R 3 1 146. 150 mi

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	54452	91.3	253 213 253 213 213	000011	1	<u>L</u> S.5	17 5	315	1.8	4.8	8.8	12-9
-		Pourrit	ure : ∠.3 -3	0	Port :/	mi eng	275 -4	ueur	: 4 vigo	repo		+4

N° d'ordre : Précoce d'Astrakan el 8 R3 s M6-150 (5.148) Désignation : Emplacement : (A) BOURGEONNEMENT Epanovi 182/- moyen 183 - globuleux 184. Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux (189) cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité Blanc 191 - fauve cu roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé (194) jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vart 198. (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT Etalées - en gouttière - autres. face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - daveteuses (203) - cotonneuses (204) - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281. Pice supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liseré carmine (03) jaune 209 (à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivsées 211 - vertes 212 - autres 213. Cons le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, An couleur de la 22me et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

oce inférieure

Juntan landa

Hervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283

timbo: glabro 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse (285)

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roum 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à places bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A péticle glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Juntanlanta

Précoce d'Astralean 8 R3 s. 146-150 (5.150)

Désignation :

dantadaalaalaalaalaalaal

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente (88) - sans villosité laineuse (289). Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré (48) - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré (251) - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré (251) - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré (257) - à raies 258 - vert 259.

: verto 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge fonce 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré part vert pason

(I) FLEUR

Bouton florai : gros - moyen - petit. Morphologiquement: mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

Récoce d'Astrakan 8 R3 s-146.150 (0.148) N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

Timping and

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux (4) - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux (5) - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité

dantadaataalaataalaadaad

laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmente l' Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface: unie 156 ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 1/68 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172. Glabre (7) - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré (76 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 87

Précoce d'Astrakay 8 R3 s-146-150 N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse 68 - Moyenne 69) - Petite 70 (dimensions 45 x Läche (1)- Moyenne 72 - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6 A pédoncule herbacé (7)- mi-aoûté (3) aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 60 non coloré (1) BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 20 x 20). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir (1) Très pruinée 62)- pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore (05) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée [11] F saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - diffilie. A pédicelle long 119 - moyen (20) - court 121. A pédicelle de couleur : verte (22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident (2) - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 184) A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue (3) juteuse (39 - molle 140 - peu juteuse. Avec périns - apyrène. Calno 87

daniminahaataalaad

Juntan matri

DENOMINATION: Precoce d'Ashakan
EMPLACEMENT: 8 R3 s 146. 150 (0-3)

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2)

: saillant (1) - effacé (2).

Judan militabahan ba

Yeux

SARVENT DE VIGNE

ilantanlımtındımtındığı ilə

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (27). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (7) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :40... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). . . . marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -

rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvose

```
Nº d'ordre :
Désignation: Précoce d'Astrakan
Emplacement: 8R3 8.146-150
                                 : (1) - 2 - 3
Angle des nervures
                                 : 4 - 5 - 6
Sexe
                                 : (7) - 8 - 9
L1/L2
                                 : (10) ~ 11
L2/L
                                 : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus petiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
                                  : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire · 30
                                : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Porme sinus latéral Sup.
Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                  : (40) - (41)
Dents : forme
                                  + 42 - (43) - (44)
Dents (angle)
                                 : (15) - 46 - 17
Angle du lobe terminal
 Sinus pet. (degar.-gar.-1/2 degar.) : 48 - 49 - 50
 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
 Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> = (60) - 61 - 62
                                 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
 Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Luntantanta